

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΧΘΡΟΣ													ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	Ακάρεα	Άσπρη ψώρα	Βαμβακάδα	Δάκος	Θρίπτες	Κοκκοειδή	Λεκάριο	Μυτλόμορφη ψώρα	Παρλατόρια	Πολλίνα	Μαργαρόνια	Πυρηνοτρήτη	Ρυγχίτης	
paraffin oil	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				21
Dimethoate				✓										28
Alpha-cypermethrin				✓										7(Δολωματικός)
Beauveria bassiana				✓										Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Beta-cyfluthrin				✓								✓		14 (Δολωματικός ψεκασμός) & 56 ημέρες με ψεκασμό κάλυψης
Deltamethrin			✓	✓	✓		✓				✓	✓		7
Lambda cyhalothrin				✓								✓		7ή 14 ή 120 (ανάλογα με το σκεύασμα και τον τρόπο ψεκασμού)
Pyrethrins				✓								✓		2
Spinosad				✓										14 (Δολ. Ψεκασμός)
Thiacloprid Triacloprid+deltametrin				✓								✓		14
Bacill us thuringiensis (ανθόβια γενιά)												✓		Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Chlorpyrifos-methyl							✓					✓		60
Diflubenzuron												✓		στην αρχή της άνθησης
Fenoxycarb							✓							60
Pyriproxyfen (Δευτερεύουσα δράση στην ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ)							✓		✓					Δεν ορίζεται λόγω του συνιστώμενου χρόνου εφαρμογής (πριν την άνθιση)
urea				✓										εντομοελκυστικά
hydrolysed proteins				✓										εντομοελκυστικά

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αναφέρονται στις ετικέτες των σκευασμάτων

Καβάλα 17/03/2014