

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΕΛΙΑΣ

ΕΠΟΧΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΧΘΡΟΥ - ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ	ΠΙΘΑΝΟΙ ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Φθινόπωρο - Αρχές Χειμώνα	Κυκλοκόνιο (μυκητολογική ασθένεια)	Χαλκός	Η μόλυνση ευνοείται από βροχοπτώσεις, αυξημένη υγρασία και θερμοκρασίες από 10-25 °C. Εμφανίζεται σε πυκνοφυτεμένους, ακλάδευτους ελαιώνες σε υγρές τοποθεσίες. Την Άνοιξη ο ψεκασμός να γίνεται όταν η νέα βλάστηση είναι περίπου 5 εκ.
Αρχές Άνοιξης	Κυκλοκόνιο (μυκητολογική ασθένεια)	Χαλκός, Dodine, Trifloxystrobin	Συνιστάται επανάληψη των ψεκασμών όταν η υγρασία είναι αυξημένη την Άνοιξη και το Φθινόπωρο.
Μάιος – Έναρξη ανθοφορίας	Βαμβακάδα	παραφινέλαιο, ορυκτέλαιο	Κατά κανόνα δεν χρειάζεται ψεκασμός.
	Φλοιοτρίβης - Φλοιοφάγος	dimethoate	Συνιστάται καταστροφή των κλάδων με φωτιά μετά το κλάδεμα. Ψεκασμός μόνο όταν τα έντομα είναι σε μεγάλους πληθυσμούς.
	Πυρηνοτρήτης (ανθόβια γενιά)	Bacillus thuringiensis, pyrethrins, chlorpyrifos-methyl, teflubenzuron, deltamethrin, diflubenzuron, beta cyfluthrin, lambda cyhalothrin, thiacloprid	Ψεκασμός μετά από ανακοίνωση της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Σερρών που παρακολουθεί την πτήση του εντόμου με δίκτυο φερομονικών παγίδων, λίγο πριν το ξεκίνημα της άνθησης, μόνο όταν η ανθοφορία είναι μικρή και ο πληθυσμός του εντόμου μεγάλος.
	Ακάρεα	Ορυκτέλαιο	Ψεκασμός μόνο στις ποικιλίες επιτραπέζιας ελιάς.
Ιούνιος - καρπόδεση	Πυρηνοτρήτης (καρπόβια γενιά)	Βλέπε πυρηνοτρήτη ανθόβιας γενιάς	Ψεκασμός μετά από ανακοίνωση της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης Σερρών όταν ο καρπός αποκτήσει μέγεθος 3-5 mm και επανάληψή του μετά από 14 -15 ημέρες.
Ιούλιος – Αύγουστος Αρχές φθινοπώρου	Δάκος	Alpha cypermethrin, Beauveria bassiana, deltamethrin, beta cyfluthrin, dimethoate, hydrolysed proteins, spinosad, lambda cyhalothrin, thiacloprid	Εφαρμογή ψεκασμών, δολωματικών ψεκασμών ή τοποθέτηση παγίδων μαζικής παγίδευσης.
	Βερτισιλλίωση	-	Ξήρανση κλάδων και ολόκληρων δένδρων. Δεν υπάρχει δραστική ουσία για την καταπολέμηση της συγκεκριμένης ασθένειας. Προτείνεται ηλιοαπολύμανση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Οι ψεκασμοί εφαρμόζονται μόνο όταν διαπιστώνεται η ύπαρξη εντόμου ή ασθένειας η οποία μπορεί να προκαλέσει ποσοτική ή ποιοτική μείωση της παραγωγής.
- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χρόνο της τελευταίας επέμβασης (ψεκασμού) πριν την συγκομιδή και στον χρόνο επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.
- Να τηρείτε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡ.

ΣΕΡΡΕΣ 2014